

ALOXAL

Name of the Product

ALOXAL Suspension.

Composition

Each 5 ml contains Aluminium hydroxide gel (15%) equivalent to 375 mg of Aluminium hydroxide & Magnesium oxide equivalent to 145 mg of Magnesium hydroxide.

Presentation

ALOXAL suspension is available in glass bottles size of 100, 120, 180 & 200 ml.

Indications

ALOXAL suspension has a fast effective non-constipating anti-acid effect. It provides a fast relief due to the effective neutralization action of Magnesium hydroxide. While Aluminium hydroxide produces a longer lasting effect due to its slow & gradual acid neutralization capacity, it has also a demulcent and protective effect on gastric ulcers. ALOXAL is useful in relieving the Gastric Hyperacidity symptoms such as Heartburn & Acid Indigestion. It is recommended for symptomatic relief of Hyperacidity associated with Peptic Ulcer, Gastritis & Gastroesophageal Reflux Disease. Also, it relieves Gastrointestinal Disturbances resulting from Stress, Smoking, Food or Excessive Coffee intake.

Dosage & Administration

✘ For adults & children over 12 years:

Unless prescribed by the physician, ALOXAL suspension should be taken as 1 – 2 teaspoonful (5 – 10 ml) after meals or at bedtime.

✘ ALOXAL should be shaken well before use.

Precautions

- ✘ ALOXAL should be used with caution in patients with appendicitis, gastrointestinal bleeding, intestinal obstruction or ulcerative colitis.
- ✘ Patients with renal failure are not advised to use antacids unless prescribed by the physician.
- ✘ ALOXAL should not be used during pregnancy or breast-feeding unless considered essential by the physician.

Contraindications

ALOXAL is contraindicated in case of known hypersensitivity to any of its components or in patients with severe renal failure.



Side Effects

ALOXAL is generally well tolerated if recommended doses are not exceeded. In very rare cases, minor side effects such as constipation, diarrhoea or stomach cramps have been reported.

Drug Interactions

- ✘ Concomitant administration of antacids with enteric-coated medicines may damage their coatings, therefore a time gap of 1 - 2 hours is recommended.
- ✘ Concomitant use of Aluminium & Magnesium containing antacids with tetracyclines, digoxin, anticholinergics, indomethacin, quinolones, lansoprazole or iron preparations may decrease the absorption of these drugs. It is advised to administer antacids ½ to 1 hour before or after using these medications.

Overdosage

Symptoms of ALOXAL suspension overdosage include bone pain, sever constipation, loss of appetite, mood or mental changes, swelling of wrists or ankles, weight loss, difficult or painful urination, dizziness, irregular heartbeat, general tiredness or weakness. If you suspect an overdose, seek medical attention immediately.

Storage Conditions

Store below 25°C, protect from light.

THIS IS A MEDICINE

- A medicine is a product that affects your health, and its consumption contrary to instructions is harmful to you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and instructions of the pharmacist who dispensed the medicine.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and harms.
- Do not stop taking this medication, unless advised by your doctor.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

Keep medicine out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers - Union of Arab Pharmacists



الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية. K.S.P. (KSPICO) الكويتية للصناعات الدوائية. Kuwait Saudi Pharmaceutical Industries Co.

ص.ب: 5512 الصفاة - الرمز البريدي: 13056 دولة الكويت - صباحان - المنطقة الصناعية - هاتف: 965 4745012/3/4 - فاكس: 965 4745361
P.O.Box: 5512 Safat - Postal Code: 13056 State of Kuwait - Subhan - Industrial Area - Tel: +965 4745012/3/4 - Fax: +965 4745361

www.kspico.com

أوكسال

اسم المنتج
معلق أوكسال.

التركيب

كل ٥ مل من معلق أوكسال تحتوي على جل هيدروكسيد الألومنيوم (١٥٪) بما يعادل ٣٧٥ ملجم من هيدروكسيد الألومنيوم و أكسيد المغنيسيوم بما يعادل ١٤٥ ملجم من هيدروكسيد المغنيسيوم.

العبوات

معلق أوكسال متوفر في عبوات زجاجية حجم ١٠٠، ١٢٠، ١٨٠ و ٢٠٠ مل.

دواعي الاستعمال

للأوكسال تأثير سريع و فعال مضاد للحموضة الزائدة في المعدة غير مسبب للإمساك. يتميز معلق أوكسال بفاعليته الكبيرة و يعود ذلك للتأثير السريع لهيدروكسيد المغنيسيوم، في حين يستمر تأثير هيدروكسيد الألومنيوم لمدة أطول وذلك لقدرته على المعادلة البطيئة و التدريجية للحموضة كما أن له تأثيراً ملطفاً للقرح و واقياً منها. يساعد أوكسال على التخلص من أعراض زيادة الحموضة في المعدة كعسر الهضم و حرقة المعدة. يوصى باستعماله للتخلص من الحموضة الزائدة المصاحبة لحالات القرح الهضمية، التهاب المعدة و الارتجاع المعدي المريئي. بالإضافة إلى ذلك، يخفف أوكسال من اضطرابات الجهاز الهضمي الناتجة عن التوتر و الانفعالات، التندخين المفرط، الطعام أو الإكثار من تناول القهوة.

الجرعة و طريقة الاستعمال

للبالغين و الأطفال فوق ١٢ سنة:

ما لم تحدد الجرعة من قبل الطبيب المختص، ينصح بتناول ١-٢ ملعقة (٥ - ١٠ مل) من معلق أوكسال بعد الوجبات أو عند النوم.
يجب رج المعلق جيداً قبل الاستعمال.

التحذيرات

يجب استعمال أوكسال بحذر مع المرضى المصابين بالتهاب الزائدة الدودية، النزيف المعدي المعوي، الانسداد المعوي أو التهاب القولون التقرحي.
لا ينصح باستعمال مضادات الحموضة للمرضى المصابين بالفشل الكلوي إلا بعد استشارة الطبيب المختص.
يجب تجنب استعمال أوكسال خلال فترتي الحمل والإرضاع إلا إذا كان تناوله ضرورياً وفقاً لرأي الطبيب المختص.

موانع الاستعمال

يمنع استخدام معلق أوكسال في حالة فرط الحساسية لأي من مكوناته أو للمرضى المصابين بفشل كلوي حاد.

أن هذا المستحضر " دواء "

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات قد يعرضك للخطر.
- اتبع إرشادات وصفة الطبيب بتطبيق طريقة الإستعمال على نحو صارم ودقيق وكذلك تعليمات الصيدلي الذي قام بصفها أو بيعها لك.
- فالطبيب والصيدلي هما خبيران بنفع الدواء وضرره.
- لا توقف من تلقاء نفسك ودون مبرر مدة العلاج المحدد لك بموجب الوصفة الطبية.
- لا تكرر استعمال الدواء الموصوف لك دون استشارة طبية.

مجلس وزراء الصحة العرب - اتحاد الصيدلة العرب



الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية. K.S.C. (39199) Kuwait Saudi Pharmaceutical Industries Co.

ص.ب: ٥٥١٢ الصفاة - الرمز البريدي: ١٢٠٥١٠٢٠٤ دولة الكويت - صبحان - المنطقة الصناعية - هاتف: ٤٧٤٥٠١٢/٢٤ - فاكس: ٤٧٤٥٠٣١١ - P.O.Box: 5512 Safat - Postal Code: 13056 State of Kuwait - Subhan - Industrial Area - Tel: +965 4745012/3/4 - Fax: +965 4745361

www.kspico.com