

DICLONA

Diclofenac Diethylamine 1.16% w/w Emulgel

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

Read this entire leaflet carefully before you start taking this medicine.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.
- If any of the side effects get serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

In this leaflet:

1. Serious Side Effects
2. What Diclon Emulgel is and what it is used for
3. Before you use Diclon Emulgel
4. How to use Diclon Emulgel
5. Possible side effects
6. How to store Diclon Emulgel
7. Further information
8. Adverse Drug Reaction (ADR) Reporting

1. Serious Side Effects

Some rare and very rare side effects might be serious

If you experience any of the following signs of allergy, STOP using Diclon Emulgel and tell a doctor or pharmacist immediately:

- Skin rash with blisters; hives (may affect between 1 and 10 in every 10,000 people).
- Wheezing, shortness of breath or feeling of tightness in the chest (asthma) (may affect less than 1 in every 10,000 people).
- Swelling of the face, lips, tongue or throat (may affect less than 1 in every 10,000 people).

2. What Diclon Emulgel is and what it is used for

Diclon Emulgel contains the active substance diclofenac which belongs to a group of medicines called non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). It is specially formulated for rubbing into the skin and used to relieve pain and reduce inflammation and swelling in painful conditions affecting the joints and muscles. Diclon Emulgel can be used to treat:

- Muscle and joint injuries (e.g. sprains, strains, bruises, backache, sports injuries)
- Tendonitis (e.g. tennis elbow)
- Mild arthritis (symptoms of mild arthritis include joint pain at rest, joint pain on movement, joint swelling or stiffness (after sleep or long rest)).

3. Before you use Diclon Emulgel

Please tell your doctor or pharmacist BEFORE using Diclon Emulgel

DO NOT use Diclon Emulgel if you:

- Have an allergy (hypersensitivity) to any of the ingredients in the product (see Section 6 What Diclon Emulgel contains).
- Have ever had an allergic reaction to diclofenac or other medicines used to treat pain, fever or inflammation, such as aspirin (acetylsalicylic acid) or ibuprofen. Symptoms of an allergic reaction to these medicines may include: asthma, wheezing or shortness of breath; skin rash or hives, swelling of the face or tongue and runny nose.
- Are using any other medicine containing diclofenac or are taking oral NSAIDs such as aspirin or ibuprofen.
- Have severe joint pain of recent onset that is not related to an injury or period of overuse.
- Feel ill, have a temperature or any other symptoms that accompany the pain
- Are in the last 3 months of your pregnancy (see also pregnancy and lactation section)

This medicine is not recommended for use in children under 14 years of age.

Take special care with Diclon Emulgel

- Do not apply the gel to the skin that has (i) a rash or eczema (ii) cuts or open wounds. Stop the treatment if a skin rash develops after applying the product.
- Avoid applying on large areas of skin and over a prolonged period of time, unless under medical advice.
- Be careful when sunbathing or using sun lamps as your skin may be more sensitive to sunlight.
- If you have a stomach or duodenal ulcer (or a history of), tell your doctor or pharmacist before using the gel.
- If you have or have ever had asthma, speak to your doctor or pharmacist before using the gel.

Taking other medicines

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking, or have recently taken, any other medicines, including those obtained without a prescription. Do not use Diclon Emulgel if you are already taking diclofenac tablets or other NSAID pain/inflammation tablets (e.g. aspirin or ibuprofen).

Pregnancy and Breast-feeding

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine. Diclon Emulgel must not be used during the last 3 months of pregnancy, as it could harm your unborn child or cause problems at delivery. Diclon Emulgel should only be used under medical advice during the first 6 months of pregnancy and the dose should be kept as low and duration of treatment as short as possible. Diclon Emulgel should only be used under medical advice during breast-feeding as diclofenac passes into breast milk in small amounts. However, Diclon Emulgel should not be applied on the breasts of nursing mothers nor elsewhere on large areas of skin or for a prolonged period of time. Consult your doctor or pharmacist for further information if you are pregnant or breastfeeding.

Driving and using machines

Diclon Emulgel, when used as directed, is not expected to have any effect on your ability to drive or use machines.

Important information about some of the ingredients of Diclon Emulgel

The gel formulation contains propylene glycol, which may cause mild localized skin irritation in some people.

4. How to use Diclon Emulgel

Always use this medicine exactly as described in this leaflet or as your pharmacist has told you. You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Adults and adolescents 14 years and over:

Before using for the first time, open as follows:

Unscrew cap and pierce the aluminium seal with the spiked top of the cap. Do not use if seal is broken.

1. How to apply:

Gently squeeze out a small amount of gel from the tube or press firmly and evenly on the nozzle of the dispenser and apply to the painful or swollen area, slowly rubbing into the skin.

2. When and how much to use:

- Apply 3 to 4 times a day. Allow at least 4 hours between applications of the gel. Do not apply more than 4 times in any 24 hour period.
- The amount needed will vary depending on the size of the painful or swollen area; an amount ranging in size from a 1 penny to a 2 pence piece (2 to 4g) will usually be sufficient.
- You may notice a slight cooling effect when you rub the gel in.
- Only use the smallest amount of Diclon Emulgel needed to relieve your pain but never use more than 16g per day and 112g in one week.

3. How and where to use:

- You can apply the gel to a maximum of 2 joints (such as your knees or elbows). If you need to apply it to more than 2 joints, consult your doctor.
- Do not rub the gel into cuts, open wounds or any other area where the skin is abnormal. After rubbing the gel into the skin, do not cover with bandages or sticking plaster.
- The gel is for external use only. Do not use it in your mouth.
- Be careful not to get the gel in your eyes. If this happens, rinse your eyes with clean water and tell your doctor.
- Wash your hands after rubbing in Diclon Emulgel, unless your hands are the site being treated.

4. For how long should you use Diclon Emulgel ?

Do not use Diclon Emulgel for more than:

- 14 days unless longer treatment is recommended by a doctor.
- For arthritis pain, you may need to apply the gel for up to 7 days (to allow its effect to build up on the joint) before you notice an improvement in your pain.
- If the pain and swelling do not improve within 7 days, or worsen, speak to your doctor.
- In children aged 14 years and over, if this product is required for more than 7 days for pain relief or if the symptoms worsen the patient/parents of the adolescent is/are advised to consult a doctor.

Children under 14 years:

This medicine is not recommended for use in children under 14 years of age.

If you use more Diclon Emulgel than you should

If you or a child accidentally swallows Diclon Emulgel, contact your doctor or accident and emergency department immediately.

If you forget to use Diclon Emulgel

If you miss your application of Diclon Emulgel at the correct time, apply it as soon as you remember then carry on as normal. Do not apply a double quantity to make up for a forgotten application. If you have any further questions on the use of this product, ask your pharmacist.

5. Possible side effects

Like all medicines, Diclon Emulgel can cause side effects, although not everybody gets them.

Some rare and very rare side effects might be serious

If you experience any of the following signs of allergy, STOP using Diclon Emulgel and tell a doctor or pharmacist immediately:

- Skin rash with blisters; hives (may affect between 1 and 10 in every 10,000 people).
- Wheezing, shortness of breath or feeling of tightness in the chest (asthma) (may affect less than 1 in every 10,000 people).
- Swelling of the face, lips, tongue or throat (may affect less than 1 in every 10,000 people).
- Other side effects which may occur are usually mild, passing and harmless (if you are concerned, tell a doctor or pharmacist).

Common side effects (may affect between 1 and 10 in every 100 people)

Skin rash, itching, reddening or smarting of the skin

Very rare side effects (may affect less than 1 in every 10,000 people)

The skin may be more sensitive to the sun. Possible signs are sunburn with itching, swelling and blistering.

Some side effects have unknown frequency (cannot be estimated from available information): local application site irritation, skin discolouration.

If any of the side effects get serious or if you notice any side effects not listed in this leaflet, STOP USING the gel and tell your doctor or pharmacist immediately.

6. How to store Diclon Emulgel

- Keep in a safe place, out of the reach and sight of children.
- Store below 30°C.
- Do not use Diclon Emulgel after the expiry date printed on the packaging. The expiry date refers to the last day of the month.
- If the gel becomes discoloured or show any other signs of deterioration, you should seek the advice of your pharmacist who will tell you what to do. Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines that are no longer required. These measures will help to protect the environment.

7. Further information

What Diclon Emulgel contains?

Each 100 gram contains: Diclofenac Diethylamine 1.16 g equivalent to 1g Diclofenac Sodium.

The excipients:

Carbopol 980, Cetomacrogol 1000, Liquid Paraffin, Polysorbate 80, Diethylamine, Isopropyl alcohol, Propylene glycol and Purified Water

What Diclon Emulgel looks like and what are the contents of the pack?

Diclon Emulgel is soft white opaque gel, free from foreign particles.

Diclon Emulgel is available in Aluminum tube with white cap, size of 30 g & 50 g.

8. Adverse Drug Reaction (ADR) Reporting

FOR REPORTING THE ADVERSE DRUG REACTIONS PLEASE REFER TO THE HEALTH AUTHORITIES.

THIS IS A MEDICINE

- Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and the pharmacist are the experts in the medicines, their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medicaments out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers - Union of Arab Pharmacists



Marketing Authorization Holder and Manufacturer
Kuwait Saudi Pharmaceutical Industries Co.
الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية.

ص:ب ٥٥١٢ الصفاة - الرمز البريدي: ١٣٠٥١ دولة الكويت - صبحان -
المنطقة الصناعية - هاتف: ٩٦٥ ٢٤٧٤٥٠١٢/٣/٤ - فاكس: ٩٦٥ ٢٤٧٤٥٣١١
P.O.Box: 5512 Safat - Postal Code: 13056 State of Kuwait - Subhan -
Industrial Area - Tel: +965 24745012/3/4 - Fax: +965 24745361
www.kspico.com

ديكلونا

ديكلوفيناك داي إيثيل أمين ١,٦٪ وزن / وزن

معلومات لمستخدم الدواء - النشرة الداخلية للمستحضر الصيدلي

قم بقراءة هذه النشرة بعناية قبل البدء باستخدام هذا الدواء.

- احفظ بيذه النشرة. قد تحتاج إقرأها مر ة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو الصيدلي.
- إن هذا الدواء قد تم صرفه خصيصاً لك بناءً على وصفة طبية، ولهذا يجب عليك عدم إعطائه لأي شخص حتى وإن كان هذا الشخص يعاني من نفس الأعراض التي سبق وأن عانيت منها.
- قم بالإلتزام بتعليمات المصانع أو الصيدلي في حال زيادة عدد الأعراض الجانبية أو الإصابة بعرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة.

تحتوي هذه النشرة على:

- أثار جانبية خطيرة**
- ما هو إميلجل ديكلونا وما هي استخداماتها؟**
- قبل استخدام إميلجل ديكلونا**
- كيفية استخدام إميلجل ديكلونا**
- الآثار الجانبية المحتملة**
- كيفية تخزين إميلجل ديكلونا**
- معلومات إضافية**
- الإبلاغ عن الأعراض الجانبية**

١. أثار جانبية خطيرة

قد تصبح بعض الآثار الجانبية الشارة أو الشارة جذاً خطيرة

إذا شُهرت بأي من الأعراض التالية للحساسية، **توقف** عن استخدام إميلجل ديكلونا وأخبر الطبيب أو الصيدلي فوراً:
• الطفح الجلدي مع ظهور بثور، شري (قد تصبح أقل من ١٠ من كل ١٠,٠٠٠ شخص).
• الصفيح وطفح الشقشق، واللسان أو الشفوي يصبغ في اللون (الربو) (قد تصبح أقل من ١ من كل ١٠,٠٠٠ شخص)
• تورم الوجه، الشقشق، اللسان أو الحلق (قد تصبح أقل من ١ من كل ١٠,٠٠٠ شخص)

٢. ما هو إميلجل ديكلونا وما هي استخداماتها؟

يحتوي إميلجل ديكلونا على المادة الفعالة "ديكلوفيناك داي إيثيل أمين"، والتي تنتمي لفئة من الأدوية تسمى "مضادات الالتهابات غير الستيرويدية". تم تركيبه خصيصاً ليتم تناوله على الجُذ ويستخد لتخفيف حدة الألم وتخفيف الالتهاب والتورم في حالات

الألم التي تسبب المفاصل والعضلات.

يستخدم إميلجل ديكلونا في الحالات التالية:

• إصابات/سحلات أو المفاصل (التهاب).

• التهاب الأوتار (مثل: مرفق التنس) - ألم وتر المرفق.

• التهاب خفيف في المفاصل (تشمل أعراض الالتهاب الخفيف في المفاصل: الألم المفصائل أثناء الراحة، الألم المفصائل أثناء الحركة، تورم أو تضيق المفاصل (تعب اليوم أو الراحة لفترة طويلة).

٣. قبل استخدام إميلجل ديكلونا

من فيسلك أنك طبيب أو الصيدلي قبل استخدام إميلجل ديكلونا

لا تستخدم إميلجل ديكلونا في الحالات التالية:

- إذا كان لديك حساسية مفرطة تجاه أي من مكونات مستحضر إميلجل ديكلونا.
- إذا كان لديك حساسية تجاه الديكلوفيناك أو أي من الأدوية الأخرى التي تستخدم لتخفيف الآلام، الحمى أو الالتهاب، مثل الأسبرين (حمض الأسيتيل ساليسيليك) أو الإيبوبروفين. قد تشمل أعراض الحساسية تجاه هذه الأدوية: الربو، الصفيح عند التعرض، ضيق التنفس، الطفح الجلدي أو الشري، تورم الوجه أو اللسان، وسيلان الأنف.
- إذا كنت تستخدم أدوية أخرى تحتوي على الديكلوفيناك، أو تتناول مضادات للالتهابات غير الستيرويدية عن طريق الفم مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين.
- إذا أصابك مؤخرًا ألم حادة في المفاصل غير مرتبطة بإصابة أو فرط الاستخدام لفترة.
- إذا كنت مرصداً لديك ارتفاع في درجة الحرارة أو أي من الأعراض الأخرى الملازمة للألم.
- إذا كنت حاملًا في الشهور الثلاثة الأخيرة من الحمل (انظري جزء الحمل والرضاعة).
- لا ينصح باستخدام إميلجل ديكلونا للأطفال أقل من ١٤ سنة.

الإحتياطات عند الإستعمال

- لا تستخدم إميلجل ديكلونا في (أ) الجذ المصاب بالطفح الجلدي أو الإكزيما، (ب) الفقع أو الجروح المفتوحة. توقف عن استخدام الدواء إذا حدث طفح جلدي بعد استخدام إميلجل ديكلونا.
- تجنب استخدامك على مناطق كبيرة في الجذ أو لفترة زمنية طويلة، ما لم ينصحك الطبيب حيث يصبح جلدك أكثر حساسية لضوء الشمس.
- إذا كان لديك قرحة في المعدة أو الإثني عشر أو لديك تاريخ مرضي لذلك، أخبر طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام إميلجل ديكلونا.
- إذا كنت تعاني أو سبق وأن عانيت من الربو، أخبر طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام إميلجل ديكلونا.

التفاعلات الدوائية

عليك أن تعلم الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستخدم، أو قد استخدمت مؤخرًا أي أدوية أخرى. بما في ذلك الأدوية التي حصلت عليها بدون وصفة طبية. لا تستخدم إميلجل ديكلونا إذا كنت تتناول أقراص ديكلوفيناك أو أي أقراص أخرى للألم أو الإلتهابات من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مثل الأسبرين والإيبوبروهين).

الحمل والرضاعة

إذا كنت حاملًا أو أما مرضعة، فتعدين أنك حاملًا أو تخططين لإلجاب طفل. إستشيري الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام إميلجل ديكلونا.

يجب عدم استخدام إميلجل ديكلونا أثناء الشهور الثلاثة الأخيرة من الحمل، حيث أنه قد يضر جنينك أو يسبب مضاعفات أثناء الولادة. يمكن استخدام إميلجل ديكلونا فقط بوسعة الطبيب أثناء السنة أشهر الأولى من الحمل، ويجب استخدامه بأقل جرعة

ولأصغر مدة زمنية ممكنة. لا تستخدم إميلجل ديكلونا فقط بوسعة الطبيب أثناء فترة الرضاعة. حيث يتم إفرز الديكلوفيناك بكميات صغيرة في حليب الثدي. ومع ذلك، يجب عدم استخدام إميلجل ديكلونا على الثدي الأم المرضعة أو في أي مناطق أخرى كبيرة في الجذ أو لفترة زمنية طويلة.

استشيري الطبيب أو الصيدلي لزم من المعلومات إذا كنت حاملًا أو أما مرضعة.

التأثير على القيادة واستخدام الآلات

عدم استخدام إميلجل ديكلونا حسب التعليمات، فمن غير المتوقع أن يؤثر على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات.

معلومات مهمة حول بعض مكونات إميلجل ديكلونا

يحتوي إميلجل ديكلونا على بروبيلين جليكول، والذي قد يسبب تهيج موضعي خفيف بالجلد عند بعض الأشخاص.

٤. كيفية استخدام إميلجل ديكلونا

استخدم إميلجل ديكلونا دائماً حسب هذه النشرة أو وصفة الصيدلي. يجب عليك التحقق مع طبيبك أو مع الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

البالغين والمراهقين بعمر ١٤ سنة وأكثر:

قبل الاستخدام لأول مرة، افتح إميلجل ديكلونا على النحو التالي:

اقطع إميلجل ديكلونا بجرم بحرق قطع الألومنيوم باستخدام الجزء المنبسط أعلى غطاء الأدوية. لا تستخدمه إذا كان ختم الألومنيوم متقطع.

١) كيفية الاستخدام

اضغط ببطء لإخراج كمية صغيرة من إميلجل ديكلونا من الأنبوب أو اضغط بشدة وثبات على قرعة الموزع وضعه على المنطقة المولمة أو المتورمة، ثم تدليكها ببطء على الجلد.

٢) متى تستخدم إميلجل ديكلونا وما هي الكمية المناسبة:
• تم استخدام إميلجل ديكلونا ٢ أو ٤ مرات في اليوم المتقطع أو المستمر.
• لا تستخدمه أكثر من ٤ مرات في خلال ٢٤ ساعة.

تختلف كمية الكمية اللازمة بناءً على حجم المنطقة المصابة أو المتورمة. تختلف حجم الكمية من حجم قطعة نقد معدنية إلى حجم قطعتين نقد معدنية (٢ إلى ٤ جرام) غالباً ما يكون كافي.

• قد تستمر بتأثير بوردة عندما تضع إميلجل ديكلونا.

• استخدم فقط أقل كمية ممكنة من إميلجل ديكلونا لتخفيف الألم ولكن لا تستخدم أكثر من ١٦ جرام في اليوم أو ١١٢ جرام في الأسبوع الواحد.

٣) فف، وأين تستخدم إميلجل ديكلونا

- يمكنك استخدام إميلجل ديكلونا على مسطحين كحد أقصى (مثلًا منطقة الركبة والكوع). إذا احتجت أن تستخدمه على أكثر من مسطحين استشر طبيبك.
- لا تم يدك لإيمجل على الفطوع أو الجروح المفتوحة أو أي منطقة يكون الجلد فيها غير طبيعي. بعددك على الجلد، لا تتم بتغطيته الجلد بالضمادات أو الضمعات.
- يستخدم إميلجل ديكلونا على المناطق الخارجية فقط. لا يستخدم في النحر.
- لا تغسل يديك بعد الحشر وتجنب لمسك لبقائك. إذا كنت تغسل يديك، اغسل يديك في المنطقة المراد علاجها.
- اغسل يديك بعد استخدام إميلجل ديكلونا إلا إذا كنت يديك هي المنطقة المراد علاجها.

٤) عدم استخدام إميلجل ديكلونا

- لا تستخدم لإيمجل ديكلونا:
- الألم أكثر من ١٤ يومًا ما لم يوصي الطبيب بذلك.
- للمدة أكثر من ١٤ يومًا، قد تحتاج إلى استخدام إميلجل ديكلونا لمدة قد تصل إلى ٧ أيام (تسمح بحدوث تأثيره على المفاصل) قبل أن تستمر بتحسن في الألم.
- إذا لم يتم في الأول أو الثاني أيام أو ٧ أيام أو أكثر، إذا طلب استخدام إميلجل ديكلونا أكثر من ٧ أيام لتخفيف الألم أو إذا أصبحت الأعراض أسوأ، فينصح بزيارتهم مع أو والديهم باستشارة الطبيب.

الأطفال أقل من ١٤ سنة

لا ينصح باستخدام إميلجل ديكلونا للأطفال أقل من ١٤ سنة.

إذا استخدمت إميلجل ديكلونا أكثر من الجرعة الموصى بها

إذا ابتلعت أنت أو الطفل إميلجل ديكلونا بطريق الخطأ، أخبر الطبيب أو قسم الحوادث والطوارئ فوراً.

إذا كنت تستخدم إميلجل ديكلونا
• إذا كنت تستخدم إميلجل ديكلونا في الوقت المحدد، قم باستخدامه حال تذكرك على النحو المعتاد ما لم يقترح موعد الجرعة التالية.

لا تخرج جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة الفائتة.

إذا كان لديك أي سؤال آخر عن استخدام إميلجل ديكلونا، اسأل الطبيب أو الصيدلي.

٥. الآثار الجانبية المحتملة

كما في جميع الأدوية، قد يسبب إميلجل ديكلونا تأثيرات جانبية، ومع تلك قد لا تحدث مع كل الأشخاص.

قد تصبح بعض الآثار الجانبية الشارة أو الشارة جذاً خطيرة:

إذا شُهرت بأي من الأعراض التالية للحساسية، **توقف** عن استخدام إميلجل ديكلونا وأخبر الطبيب أو الصيدلي فوراً:

- الطفح الجلدي مع ظهور بثور، شري (قد تصبح ما بين ١ من كل ١٠,٠٠٠ شخص).
- الصفيح وطفح الشقشق، واللسان أو الشفوي يصبغ في اللون (الربو) (قد تصبح أقل من ١ من كل ١٠,٠٠٠ شخص)
- تورم الوجه، الشقشق، اللسان أو الحلق (قد تصبح أقل من ١ من كل ١٠,٠٠٠ شخص)
- الآثار الجانبية الأخرى التي قد تحدث وما بين ١ إلى ١٠ من كل شخص، عبارة عن غير ضارة (إذا كنت قلقًا، أخبر الطبيب أو الصيدلي).
- الآثار الجانبية الشائعة** (قد تصبح ما بين ١ إلى ١٠ من كل ١٠٠ شخص):

• الطفح الجلدي، الحكّة، احمرار أو الألم.

• الآثار الجانبية الشارة أو الشارة جذاً (قد تصبح أقل من ١ إلى ١٠ من كل ١٠,٠٠٠ شخص):

• قد يصبح جلدك أكثر حساسية لأشعة الشمس. التمسّس. استخدموا الحماية على جروق الشمس مسبوكة بحكة، تورم وظهور طفحرات.

بعض الآثار الجانبية ليس لها تكرر معروف (لا يمكن تقديرها من المعلومات المتوفرة):
• تهيج في منطقة الاستخدام الموضعي، وتغير لون الجلد.

يرجى التوقف عن استخدام إميلجل ديكلونا وأخبار الطبيب أو الصيدلي إذا أصبحت إحدى تلك الآثار الجانبية خطيرة أو إذا لاحظت حدوث آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة.

٦. كيفية تخزين إميلجل ديكلونا

- احفظ الدواء في مكان آمن، بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.
- يحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة مئوية.
- لا تستخدم إميلجل ديكلونا بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على العبوة. تاريخ الانتهاء يشير إلى اليوم الأخير من الشهر.
- لا تغير لون إميلجل ديكلونا أو ظهر عليه أي علامات التلف، قم باستشارة الصيدلي.
- يجب أن لا يتم التخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو الفتائل المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد مطلوبة. وسوف تساعد هذه التائير على حماية البيئة.

٧. معلومات إضافية

مم يتكون إميلجل ديكلونا؟

تحتوي كل ١٠٠ جم من إميلجل ديكلونا على ١,١٦ جم ديكلوفيناك داي إيثيل أمين ما يكافئ ١ جم ديكلوفيناك سدوديوم.

السواغ

كافيكول، ٩٨٠، سيمتوكوجول ١,٠٠٠، برايفين سال، بوليوسويت ٨٠، داي إيثيل أمين، كحول إيزوبروبيل، بروبيلين جليكول، وماء منفي.

ما هو الشكل الصيدلي لإميلجل ديكلونا وما هي محتويات العبوة؟

إميلجل ديكلونا عبارة عن جل لين غير شفاف، أبيض اللون، خالي من الزيوت النباتية.

إميلجل ديكلونا متوفر في أنبوب الألومنيوم مع غطاء أبيض اللون، بحجم ٣٠ جم و ٥٠ جم.

٨. الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

لتبليغ عن الأعراض الجانبية يرجى الرجوع إلى السلطات الصحية.

أن هذا المستحضر "دواء "

الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات قد يعرضك للخطر.

- تتبع إرشادات الطبيب بتعليم طريقة الإستعمال على نحو صارم و دقيق وكذلك تعليمات الصيدلي الذي قام بصرفها أو بيعها لك.

- قاطبتيه والصيدلي هما خيران بنفع الدواء وضرره.

- لا تؤكف من تلقاء نفسك ودون مبرر من مدة العلاج المحدد لك بموجب الوصفة الطبية.

- لا تكرر استعمال الدواء الموصوف لك دون استشارة طبية.

- احفظ الدواء بعيدا عن متناول الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب - اتحاد الصيدالة العرب

الشركة المصنعة والمفوضة بالتسويق

Kuwait Saudi Pharmaceutical Industries Co. K.S.P.I (Sole)

الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية. ص.ب ٥٥١٢ الصفاة - اليرموال/البريد: ١٣٠٥١ دولة الكويت - صبحان -

المنطقة الصناعية - هاتف:٠٩٦٥ ٢٤٧٤٥٠ /١١٢٢٢- فاكس:٠٩٦٥ ٢٤٧٤٥١٦١-٩٦١٥

P.O.Box: 5512 Safat - Postal Code: 13056 State of Kuwait - Subhan -

Industrial Area - Tel- +965 24745012/3/4 - Fax- +965 24745361

www.kspico.com